

บัญชีรายการยา โรงพยาบาลรัตนภูมิ

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5
(เดือน พฤษภาคม ปี 2567)



โรงพยาบาลรัตนภูมิ
RATTAPHUM HOSPITAL



จัดทำโดย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

สารบัญ


	หน้า
<u>บัญชียาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาล</u>	
- บัญชียาแผนปัจจุบัน	1
<u>บัญชียาสมุนไพรในโรงพยาบาล</u>	
- บัญชียาสมุนไพร	34
<u>บัญชียาสันนิบาสน</u>	
- บัญชียา service plan 9 รายการกรณี refer back	36
- บัญชียาสันนิบาสนเฉพาะรายจากหน่วยงานนอก	37

เขียน ผอ. พ. รุ่งเรือง

- เมื่อไปตรวจพบยา



28 พค 2567


Ca
28 พค 2567

บัญชียาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลรัษฎุมิ

1.บัญชียาแผนปัจจุบัน

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
1)	กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร(Gastro-intestinal system)		
1.1	<i>Antacids and other drugs for dyspepsia</i>		
1	Dri Aluminium hydroxide gel 250 mg + Magnesium trisilicate 500 mg + Peppermint 0.004 ml (Antacid)	chewable tab	ก
2	Compound cardamom tincture + Strong capsicum tincture + Strong ginger tincture ขวด 180 ml (M. Carminative)	mixt.	ก
3	Simethicone 80 mg tab	chewable tab	ก
4	Simethicone 40 mg/0.6 ml ขวด 15 ml	Suspension	ก
5	Aluminium hydroxide 660 mg + Magnesium hydroxide 360 mg + Simethicone 50 mg ต่อ 15 ml ขวด 240 ml (Alum milk)	Sol.gel	NED
1.2	<i>Antispasmodics and other drugs altering gut motility</i>		
1	Hyoscine-n-butylbromide 10 mg	tab	ก
2	Hyoscine-n-butylbromide 5 mg/5 ml ขวด 30 ml	Syr.	ก
3	Hyoscine-n-butylbromide inj 20 mg./ml.	sterile sol	ก
4	Domperidone 5 mg/5 ml ขวด 30 ml	susp	ก
5	Domperidone maleate 10 mg คำเตือนและข้อควรระวัง ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยอายุมากกว่า 80 ปี และไม่ใช้ยาขนาดเกินกว่า 30 mg ต่อวัน	tab	ก
6	Metoclopramide 10 mg	tab	ก
7	Metoclopramide 10 mg inj 10 mg./2ml.	sterile sol	ก
1.3	<i>Ulcer-healing drugs and drugs us in variceal bleing</i>		
1	Omeprazole 20 mg	cap	ก
2	Omeprazole 20 mg inj 40 mg	sterile powder	ข
1.4	<i>Drugs us in acute diarrhoea</i>		
1	Oral rehydration salts คำแนะนำ การชดเชยสารน้ำและเกลือแร่เป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน การให้ยาด้านแบคทีเรีย ในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นสิ่งไม่จำเป็นและควรหลีกเลี่ยง	oral powder	ก
1.5	<i>Laxatives</i>		
1	Magnesium hydroxide (MOM) ขวด 60 ml	susp	ก
2	Lactulose ขวด 100 ml	Syr.	ข

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	เอนไซม์ 1. ใช้สำหรับ hepatic encephalopathy 2. ใช้สำหรับ chronic constipation ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี 3. ใช้เป็นทางเลือกในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ยาระบายอื่นไม่ได้ 4. ใช้เป็นทางเลือกในผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้ magnesium		
3	Sodium phosphate 7 g + Sodium biphosphate 19 g enema x 133 ml (UNISON)	ENEMA	ก
4	UNISON ENEMA CHILD 20 ml.	ENEMA	ก
2)	กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด(Cardiovascular system)		
2.1	Positive inotropic		
1	Digoxin tab 0.25 mg	tab	ก
2	Digoxin inj 0.5 mg/2 ml	sterile sol	ก
2.2	Diuretics		
1	Furosemide inj. 20 mg/2 ml	sterile sol	ก
2	Furosemide 40 mg	tab	ก
3	Furosemide inj. 250 mg/25 ml	sterile sol	ก
4	Hydrochlorothiazide 25 mg	tab	ก
5	Spironolactone 25 mg	tab	ก
6	MANNITOL 20% 100 ml	sterile sol	ก
2.3	Anti-arrhythmic drugs		
1	Adenosine เอนไซม์ 1. ใช้สำหรับรักษา supraventricular tachycardia 2. ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดหัวใจเพื่อรักษาภาวะ no reflow ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) เมื่อมีข้อห้ามใช้ยา verapamil หรือไม่มียา verapamil ให้ใช้ 3. ใช้สำหรับการตรวจพิเศษทางหัวใจ	sterile sol	ก
2	Atropine sulfate 0.6mg/ml inj เอนไซม์ ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ	sterile sol	ก
3	Magnesium sulfate inj 50% (1 g) x 2 ml, 10% (1 g) x 10 ml เอนไซม์ ใช้สำหรับ refractory ventricular tachycardia	sterile sol	ก
4	Amiodarone hydrochloride 150 MG/3ML INJ เอนไซม์ ใช้สำหรับ supraventricular และ ventricular arrhythmias	sterile sol	ค
5	Lidocaine hydrochloride (preservative free) inj 2% x 10 ml	sterile sol	ก
2.4	Beta-adrenoceptor blocking drugs		

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
1	Metoprolol tartrate 100 mg	tab	ก
2	Propranolol hydrochloride 10 mg	tab	ก
3	Propranolol hydrochloride 40 mg	tab	ก
4	Carvilol tab 6.25, 25 mg เงื่อนไข ใช้สำหรับ heart failure with reduced ejection fraction	tab	ค
5	Atenolol tab 50 mg	tab	ก
2.5	Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs		
2.5.1	<u>Vasodilator antihypertensive drugs</u>		
1	Hydralazine hydrochloride 25 mg	tab	ก
2	Hydralazine hydrochloride for inj 20 mg/2 ml เงื่อนไข ชนิดฉีดใช้สำหรับ hypertensive emergencies* ในหญิงตั้งครรภ์	sterile sol	ก
2.5.2	<u>Alpha-adrenoceptor blocking drugs</u>		
1	Doxazosin mesilate 2 mg	tab	ค
2.5.3	<u>Angiotensin-converting enzyme inhibitors</u>		
1	Enalapril maleate 20 mg	tab	ก
2	Enalapril maleate 5 mg	tab	ก
3	Captopril 5 mg เงื่อนไข ใช้สำหรับ hypertensive urgency*	tab	ก
2.5.4	<u>Angiotensin-II receptor antagonists</u>		
1	Losartan potassium 50 mg เงื่อนไข ใช้กับผู้ป่วยที่เข้ายาในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไม่ได้ เนื่องจากเกิดการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว	tab	ข
2.6	Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators		
2.6.1	<u>Nitrates</u>		
1	Isosorbide dinitrate 5 mg	Sublingual tab	ก
2	Isosorbide dinitrate 10 mg	tab	ก
3	NITROGLYCERINE INJ. 50 mg/10 ml	sterile sol	ก
2.6.2	<u>Calcium-channel blockers</u>		
1	Amlodipine besylate 5 mg	tab	ก
2	Nifedipine 20 mg เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้ methyldopa และ hydralazine แล้วไม่ได้ผล 2. ใช้สำหรับ intractable Raynaud's phenomenon	SR tab	ง

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
3	Manidipine hydrochloride 20 mg เงื่อนไข ใช้สำหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่ทนต่อผลข้างเคียงของยา amlodipine ไม่ได้	tab	ข
4	Nicardipine hydrochloride inj 10 mg/10 ml เงื่อนไข 1. ใช้กับผู้ป่วย hypertensive emergencies ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ 2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา sodium nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate (nitroglycerin) ได้	sterile sol	ค
2.7	Sympathomimetics		
2.7.1	Inotropic sympathomimetics		
1	Dopamine hydrochloride inj 250 mg/10 ml	sterile sol	ก
2.7.2	Vasoconstrictor sympathomimetics		
1	NOREPINEPHRINE 4 MG/4 ml (LEVOPH)	sterile sol	ก
2.7.3	Drugs us in cardiopulmonary resuscitation		
1	Epinephrine 1 mg/ml (Adrenaline)	sterile sol	ก
2.8	Anticoagulants		
1	Warfarin sodium tab 2 mg	tab	ค
2	Warfarin sodium tab 3 mg	tab	ค
3	Warfarin sodium tab 5 mg	tab	ค
2.9	Antiplatelet drugs		
1	Aspirin 300 mg	EC tab	ก
2	Aspirin 81 mg	EC tab	ก
3	Clopidogrel bisulfate 75 mg เงื่อนไข 1. ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ aspirin ไม่ได้ หรือไม่ได้ผล (aspirin failure) เฉพาะกรณี ที่ใช้ป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) 2. ให้ร่วมกับ aspirin หลังการใส่ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับ aspirin แล้วยังเกิด acute coronary syndrome หรือ recurrent thrombotic events 4. ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็น non-ST elevate acute coronary syndrome (NSTEMI) ให้ใช้ clopidogrel ร่วมกับ aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หมายเหตุ ระมัดระวังการใช้ยา clopidogrel ร่วมกับ aspirin เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการเลือดออกได้มากกว่าการใช้ aspirin หรือ clopidogrel เพียงชนิดเดียว	tab	ค

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
2.10	Fibrinolytic drugs		
1	Streptokinase for inj 1.5 mu	sterile powder	ก
2.11	Hemostatics		
1	Tranexamic acid inj 250 mg/5 ml คำเตือนและข้อควรระวัง ใช้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและมีภาวะเลือดออกรุนแรง การให้ยาภายใน 3 ชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเสียชีวิต แต่การให้ยาหลังจาก 3 ชั่วโมง อาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเลือดออก หมายเหตุ การใช้ Tranexamic ไม่สามารถทดแทนการรักษาที่จำเป็นอื่น ๆ ได้ เช่น การให้เลือด เป็นต้น	sterile sol	ก
2	Tranexamic acid cap 250 mg เงื่อนไข 1. ใช้ในทางทันตกรรมเฉพาะกรณีห้ามเลือดด้วยวิธีปกติแล้วไม่ได้ผล 2. ใช้ก่อนทำการหัตถการในช่องปากในผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเลือดออกแล้วหยุดยาก 3. ใช้สำหรับภาวะระดูมากผิดปกติ (menorrhagia)	cap	ค
2.12	Lipid-regulating drugs		
1	Simvastatin 10 ,40 mg คำเตือนและข้อควรระวัง 1. กรณีผู้ป่วยรายใหม่ไม่ควรให้ยา simvastatin เกินวันละ 40 mg สำหรับผู้ป่วยที่เคยใช้มานานเกิน 1 ปี โดยไม่เกิดผลข้างเคียงให้ใช้ยาในขนาดเดิมต่อไปได้ 2. ห้ามใช้ยา simvastatin ร่วมกับ gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรือ ยาในกลุ่ม strong CYP3A4 inhibitors เช่น itraconazole, ketoconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV protease inhibitors เป็นต้น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หยุดยา simvastatin ระหว่างใช้ยาดังกล่าว 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยา simvastatin 3.1 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา amlodipine หรือ amiodarone 3.2 ในขนาดเกินวันละ 10 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา diltiazem หรือ verapamil	tab	ก
2	Gemfibrozil 600 mg	tab	ก
3	Atorvastatin 40 mg เงื่อนไข Atorvastatin 40 mg เป็น high intensity statin ที่มีข้อบ่งใช้ในกรณีต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยที่ใช้ยา simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกัน 3 – 6 เดือน	tab	ข

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย 2. Familial hypercholesterolemia (เป้าหมาย LDL-C <100 มก./ดล.) 3. ผู้ป่วยที่กำลังเกิด acute vascular events เช่น acute coronary syndrome หรือผู้ป่วย clinical ASCVD ที่มี acute vascular events ภายในระยะ เวลา 12 เดือน (เป้าหมาย LDL-C <70 มก./ดล.) 4. ผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดหรือสมองขาดเลือดชั่วคราวที่ไม่ได้เกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจและมีระดับ LDL-C $\geq$ 100 มก./ดล. (เป้าหมาย LDL-C <70 มก./ดล.) 5. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ simvastatin ได้ กล่าวคือมีผลข้างเคียง ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ (upper limit of normal) หรือค่า creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ หรือมีการใช้ยาที่ทำให้เกิดอันตรกิริยากับ simvastatin จนอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง คำเตือนและข้อควรระวัง 1. หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับ cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir) 2. หลีกเลี่ยงการใช้ยา atorvastatin 2.1 ในขนาดเกินวันละ 40 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา nelfinavir 2.2 ในขนาดเกินวันละ 20 mg เมื่อใช้ร่วมกับยา clarithromycin, itraconazole, HIV protease inhibitor (saquinavir + ritonavir, darunavir + ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir) 3. ระมัดระวังการใช้ยา atorvastatin ร่วมกับยา lopinavir + ritonavir โดยให้ใช้ยา atorvastatin ในขนาดต่ำสุดเท่าที่จำเป็น		
3)	กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบหายใจ (Respiratory system)		
3.1	Bronchodilators		
3.1.1	<u>Adrenoceptor agonists</u>		
1	Salbutamol sulfate 2 mg	tab	ก
2	Salbutamol sulfate 2 mg/5 ml ขวด 60 ml	syr	ก
3	Salbutamol sulphate 100 mcg/dose ขวด 200 dose	MDI	ก
4	Salbutamol 0.5% ขวด 20 ml	NB	ก
5	Terbutaline sulfate inj 0.5 mg/ml	sterile sol	ก
3.1.2	<u>Compound antimuscarinic bronchodilators</u>		
1	Ipratropium+Fenoterol (250 mcg/500 mcg ต่อ ml) ขวด 20 ml (Berodual)	NB	ก
2	Ipratropium+Fenoterol (20 mcg/50 mcg ต่อ dose) ขวด 200 dose (Berodual)	MDI	ก
3	Tiotropium 18 mcg/dose กล่อง 30 dose (Spiriva)	Handihaler	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
3.1.3	Theophylline		
1	Theophylline SR 200 mg	SR-tab	ก
3.2	Corticosteroids		
1	Budesonide 200 mcg/dose ขวด 200 dose	MDI	ก
2	Salmeterol/Fluticasone (25 mcg/125 mcg ต่อ dose) ขวด 120 dose (EvoFlo)	MDI	ค
3	Salmeterol/Fluticasone (50 mcg/250 mcg ต่อ dose) กล่อง 60 dose (Seretide) หมายเหตุ 1. ใช้สำหรับควบคุมอาการ ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 2. การใช้ long acting beta2-agonists (LABAs) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด	accuhaler	ค
4	Budesonide/Formoterol (160 mcg/4.5 mcg ต่อ dose) ขวด 120 dose (Symbicort) หมายเหตุ 1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการ และ ควบคุมอาการ ในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 2. การใช้ long acting beta2-agonists (LABAs) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยาเดี่ยว เพิ่มความเสี่ยงของโรคหืดกำเริบรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคหืด	turbuhaler	ค
3.3	Leukotriene receptor antagonists		
1	Montelukast sodium FC tab 10 mg เงื่อนไข ใช้ยาชนิด oral granules กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี คำเตือนและข้อควรระวัง ควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์ทาง neuropsychiatric จากการใช้อย่างต่อเนื่อง	tab	ก
3.4	Antihistamines ไม่ควรใช้ antihistamines เป็นประจำ (routinely) ในโรคหวัด (common cold) เนื่องจากมีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาหลอก (placebo)		
1	Chlorpheniramine maleate 2 mg/5 ml ขวด 60 ml	syr	ก
2	Chlorpheniramine maleate 4 mg	tab	ก
3	Chlorpheniramine maleate injection 10 mg/1 mL	sterile sol	ก
4	Cetirizine 10 mg	tab	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
5	Hydroxyzine 10 mg	tab	ก
6	Cyproheptadine 4 mg	tab	ข
3.5 Cough preparations			
3.5.1	<u>Cough suppressants</u>		
1	Codeine 10 mg	tab	ค
2	Dextromethorphan hydrobromide 15 mg	tab	ก
3.5.2.	<u>Expectorant and demulcent cough preparations</u>		
1	Ammonium carbonate and senega mixture ขวด 60 ml	mixt	ก
2	Brown mixture ขวด 60 ml	mixt	ก
3	Bromhexine 8 mg	tab	NED
4	Bromhexine 4 mg/5 ml ขวด 60 ml	Syr.	NED
5	Acetylcysteine 200 mg	powder	NED
6	Brown mixture ขวด 180 ml	mixt	ก
4)	กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ยานอนหลับ (hypnotics) ไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เนื่องจาก ควรรักษาที่ต้นเหตุของการนอนไม่หลับ การใช้ยาเกินความจำเป็นมักนำไป สู่ปัญหาการติดยา		
4.1	Hypnotics and anxiolytics		
1	Diazepam tab 2 mg	tab	ก
2	Diazepam tab 5 mg	tab	ก
3	Diazepam inj 10 mg/2 ml	sterile sol	ก
4	Clonazepam tab 0.5 mg	tab	ข
5	Clonazepam tab 2 mg	tab	ข
6	Dipotassium clorazepate cap 5 mg	cap	ข
7	Lorazepam tab 0.5 mg	tab	ก
4.2	Drugs us in psychoses and relat disorders		
4.2.1	Antipsychotic drugs		
1	Chlorpromazine hydrochloride tab 25 mg	tab	ก
2	Chlorpromazine hydrochloride tab 100 mg	tab	ก
3	Chlorpromazine hydrochloride inj 50 mg/2 ml	tab	ก
4	Clozapine tab 25 ,100 mg เงื่อนไข 1. ไม่ใช่เป็นยาตัวแรกในการรักษา 2. ควรได้รับการวินิจฉัย และการรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตเวชศาสตร์	tab	ค
5	Haloperidol tab 0.5 mg	tab	ก
6	Haloperidol tab 2 mg	tab	ก
7	Haloperidol tab 5 mg	tab	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
8	Haloperidol inj 5 mg/ml	sterile sol	ก
9	Perphenazine tab 4 mg	tab	ก
10	Perphenazine tab 8 mg	tab	ก
11	Perphenazine tab 16 mg	tab	ก
12	Risperidone tab 1,2 mg และ oral sol 1 mg/ml x 100 ml คำเตือนและข้อควรระวัง ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ	tab	ข
13	Fluphenazine decanoate inj 50 mg/2 ml	sterile sol	ข
14	Haloperidol decanoate inj 50 mg/ 1ml	sterile sol	ก
4.2.2	<u>Antimanic drugs</u>		
1	Carbamazepine tab 200 mg	tab	ก
2	Lithium carbonate cap 300 mg	cap	ก
3	Sodium valproate EC tab 200 mg	tab	ก
4	Sodium valproate SR tab 500 mg	tab	ข
4.3	Antidepressant drugs		
1	Amitriptyline hydrochloride tab 10 mg	tab	ก
2	Amitriptyline hydrochloride tab 25 mg	tab	ก
3	Fluoxetine hydrochloride tab 20 mg	tab	ก
4	Imipramine hydrochloride tab 25 mg	tab	ก
5	Nortriptyline hydrochloride tab 25 mg	tab	ก
6	Trazodone hydrochloride tab 50 mg	tab	ค
7	Sertraline tab 50 mg	tab	ก
4.4	Central nervous system stimulants		
1	Methylphenidate tab 10 mg เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 2. ใช้สำหรับ narcolepsy	tab	ค
4.5	Drugs us in nausea and vertigo		
4.5.1	<u>Drugs us in nausea and vomiting</u>		
1	Domperidone maleate 5 mg/5 ml ขวด 30 ml	susp	ก
2	Domperidone maleate 10 mg	tab	ก
3	Metoclopramide 10 mg	tab	ก
4	Metoclopramide inj 10 mg/2 ml	sterile sol	ก
4.5.2.	<u>Drugs us in vestibular disorders</u>		
1	Betahistine 6 mg	tab	ข
2	Dimenhydrinate 50 mg	tab	ก
3	Cinnarizine 25 mg	tab	NED
4	Dimenhydrinate inj 50 mg/ml	sterile sol	ก
4.6	Analgesics and antipyretics		

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
1	Paracetamol 120 mg/5 mlขวด 60 ml	syr	ก
2	Paracetamol 325 mg	tab	ก
3	Paracetamol 500 mg	tab	ก
4	Aspirin 300 mg คำเตือนและข้อควรระวัง ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี สำหรับลดไข้ แก้ปวด เพราะ เสี่ยงต่อการเกิด Reye's syndrome หมายเหตุ Aspirin ชนิด EC tab ดูดซึมได้ช้าจึงมีการเริ่มต้นออกฤทธิ์ช้า ไม่เหมาะจะ นำมาใช้ในข้อบ่งใช้	EC tab	ก
5	Ibuprofen 200 ,400 mg และ 100 mg/5 ml ขวด 60 ml คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะเวลาในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อต้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยา แอสไพริน 2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 3. ระวังการเกิดเลือดออกในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก	EC tab	ก
6	Paracetamol 300 mg/2 ml	sterile sol	NED
4.7	Analgesics		
4.7.1	<u>Opioid analgesics</u>		
1	FENTANYL PATCH 4.2 mg. ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	PATCH	ค
2	Morphine sulfate IR tab 10 mg ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	tab	ค
3	Morphine sulfate SR tab 10 mg (MST) ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	tab	ค
4	Morphine sulfate SR tab 30 mg (MST continus) ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	tab	ค
5	Morphine sulfate oral sol 2 mg/ml x 60 ml ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	syr	ค
6	Morphine sulfate inj 10 mg/ml ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
7	Pethidine hydrochloride inj 50 mg/ml ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	sterile sol	ค
8	Tramadol hydrochloride cap 50 mg	cap	ค
9	Tramadol hydrochloride inj 50 mg/ml	sterile sol	ค
10	Methadone hydrochloride oral sol 10mg/ml ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	syr	ค
4.7.2	<u>Drugs for neuropathic pain</u>		
1	Carbamazepine tab 200 mg	tab	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
2	Gabapentin cap 100 mg เจ็อนไซ ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น หมายเหตุ ไม่มีหลักฐานว่ามีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อพังผืด กระดูกและข้อ	cap	ง
4.7.3	<u>Antimigraine</u>		
4.7.3.1	<u>Drugs for acute migraine attack</u>		
1	Paracetamol		
2	Aspirin_300 mg		
3	Ibuprofen		
4	Ergotamine tartrate 1 mg	tab	ค
4.7.3.2	<u>Drugs us in the prophylaxis of migraine</u>		
1	Amitriptyline hydrochloride		
2	Propranolol hydrochloride		
3	Sodium valproate เจ็อนไซ ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น		
4.8	Antiepileptics		
4.8.1	<u>Drugs us in the control of epilepsy</u>		
1	Phenobarbital 60 mg วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	ก
2	Phenyltoin 100 mg	cap	ก
3.	Phenytoin sodium inj 250 mg/5 ml	sterile sol	ก
4	Sodium valproate EC tab 200 mg	tab	ก
5	Sodium valproate SR tab 500 mg	tab	ข
6	Magnesium sulfate	sterile sol	ก
7	Carbamazepine tab 200 mg	tab	ก
8	Clonazepam 0.5 , 2 mg วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	ข
4.8.2	<u>Drugs us in status epilepticus</u>		
1	Diazepam inj 10 mg/2 ml	sterile sol	ก
2	Phenytoin sodium inj 250 mg/5 ml	sterile sol	ก
4.9	<u>Drugs us in movement disorders</u>		
1	Trihexyphenidyl hydrochloride tab 2 mg	tab	ก
2	Trihexyphenidyl hydrochloride tab 5 mg	tab	ก
3	Diazepam	tab	ก
4	Propranolol hydrochloride	tab	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	เจ็อนไซ ใช้สำหรับ essential tremor		
5	Trihexyphenidyl hydrochloride	tab	ก
6	Clonazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	tab	ข
4.10	Drugs us in substance dependence		
4.10.1	Drugs us in smoking cessation		
1	Nortriptyline hydrochloride tab 25 mg	tab	ก
4.10.2	Drugs us in opioid dependence		
1	Methadone hydrochloride oral sol 10mg/ml ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เจ็อนไซ ใช้สำหรับผู้ป่วยติดเฮโรอีน	syr	ง
5)	กลุ่มยาต้านการติดเชื้อ(Anti- Infections)		
5.1	Antibacterial drugs		
5.1.1	Penicillin		
1	Amoxicillin trihydrate 125 mg/5 ml ขวด 60 ml	dry syr	ก
2	Amoxicillin trihydrate 250 mg	cap	ก
3	Amoxicillin trihydrate 500 mg	cap	ก
4	Dicloxacillin sodium 62.5 mg/5 ml ขวด 60 ml	dry syr	ก
5	Dicloxacillin sodium 250 mg	cap	ก
6	Dicloxacillin sodium 500 mg	cap	ก
7	Penicillin V 250 mg	tab	ก
8	Penicillin V 125 mg/5 ml ขวด 60 ml	syr	ก
9	Amoxicillin trihydrate+ Potassium clavulanate (875/125) 1 gm เจ็อนไซ 1. ใช้สำหรับการติดเชื้อที่สงสัยว่าอาจเกิดจากเชื้อ Haemophilus influenzae และ/หรือ Moraxella catarrhalis ที่ดื้อต่อ ampicillin 2. ใช้รักษาโรคติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียชนิด aerobes และ anaerobes 3. ใช้ยาเม็ดเฉพาะความแรง 500 + 125 mg ในการรักษา melioidosis เพื่อใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ของ oral co-trimoxazole	tab	ค
10	Ampicillin sodium for inj 250 mg	Sterile power	ก
11	Ampicillin sodium for inj 500 mg	Sterile power	ก
12	Ampicillin sodium for inj 1 g	Sterile power	ก
13	Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine) for inj 1.2 mu	Sterile power (as sodium or potassium)	ก
14	Penicillin G sodium, PGS for inj 5 mu	Sterile power	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
15	Cloxacillin sodium for inj 1 g	Sterile power	ก
5.1.2	<u>Macrolides</u>		
1	Azithromycin 250 mg เจือปน 1.ใช้สำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง กรณีที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ ได้ผล 2.ใช้รักษาการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM) 3.ยา azithromycin ขนาด 2 กรัม กิน ครั้งเดียว สำหรับรักษาผู้ป่วย early syphilis ที่ไม่สามารถ ใช้อา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได้ 4.ใช้สำหรับ non-severe rickettsiosis ที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้าง เคียงของยา doxycycline ได้หรือ ผู้ป่วยมีข้อห้ามในการใช้ยา doxycycline	cap	ง
2	Erythromycin estolate 125 mg/5 ml ขวด 60 ml เจือปน ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี หมายเหตุ ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคตับ	dry syr	ก
3	Roxithromycin 150 mg	tab	ก
5.1.3	<u>Tetracycline</u>		
1	Doxycycline 100 mg	cap	ก
5.1.4	<u>Quinolone</u>		
1	Ciprofloxacin 250 mg เจือปน ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เช่น ใช้ต่อเนื่องจากยาฉีด (sequential therapy หรือ switch therapy)	tab	ง
2	Norfloxacin 400 mg	tab	ก
3	Ofloxacin 200 mg เจือปน ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรม ลบ	tab	ข
5.1.5	<u>Sulfonamide</u>		
1	Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole) (400 mg/80 mg)	tab	ก
2	Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole) (200 mg/40 mg) ขวด 60 ml	Suspension	ก
5.1.6	<u>Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams</u>		
1	Cefazolin sodium for inj 1 g หมายเหตุ ใช้ก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (preoperative antibiotic prophylaxis)	Sterile power	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
2	Ceftazidime for inj 1 g เจ็อนไซ ใช้เป็น empiric/specific therapy สำหรับการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ melioidosis	Sterile power	ค
3	Ceftriaxone sodium for inj 1 g เจ็อนไซ 1. ใช้สำหรับ serious community acquir bacterial infection ยกเว้นการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa 2. ใช้สำหรับ gram-negative meningitis ยกเว้นในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี 3. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Penicillin Resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP) 4. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบบางกรณีในผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่อง หรือมีข้อห้ามซึ่งไม่สามารถใช้ยา กลุ่ม aminoglycosides ได้ 5. ใช้สำหรับการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae 6. ใช้กับผู้ป่วยซิฟิลิสที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ซึ่งใช้ benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได้	Sterile power	ค
5.1.7	<u>Aminoglycosides</u> ยา streptomycin sulfate และ amikacin sulfate ดูที่ Antituberculous drugs		
1	Gentamicin sulfate inj 80 mg/2 ml	Sterile sol	ก
2	Amikacin sulfate inj 500 mg/2 ml เจ็อนไซ ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดที่ดื้อต่อ gentamicin และ/หรือ netilmicin หมายเหตุ จัดเป็นบัญชี ค เมื่อใช้รักษา drug-resistant tuberculosis	Sterile sol	ข
5.1.8	<u>Some other antibacterials</u>		
1	Metronidazole 400 mg	tab	ก
2	Metronidazole 500 mg inj	Sterile sol	ก
3	Clindamycin 300 mg	cap	ข
4	Clindamycin phosphate inj 600 mg/4 ml เจ็อนไซ 1. ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobes, แบคทีเรียแกรมบวก ชนิดรุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ยา กลุ่ม beta-lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการติดเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียแกรมบวก และ anaerobes 2. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกันหรือรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) ในผู้ป่วยเอดส์	Sterile sol	ข

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	3. ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ก่อนการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (pre-operative prophylaxis) ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา penicillin หรือยาในกลุ่ม beta-lactam อย่างรุนแรง 4. ไม่ควรใช้รักษาโรคติดเชื้อนอกเหนือไปจากข้อ 1 ถึงข้อ 3 เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิด Antibiotics Associated Colitis (AAC) หมายเหตุ AAC เกิดได้กับยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้างทุกชนิดแม้แต่ amoxicillin		
5.1.9	<u>Antituberculous drugs</u>		
1	Ethambutol hydrochloride FC tab 400 mg	tab	ก
2	Ethambutol hydrochloride tab 500 mg	tab	ก
3	Isoniazid tab 100 mg	tab	ก
4	Pyrazinamide tab 500 mg	tab	ก
5	Rifampicin cap 300 mg	cap	ก
6	Rifampicin cap 450 mg	cap	ก
7	STREPTOMYCIN SULPHATE 1 g	Sterile powder	ค
8	Amikacin sulfate inj 500 mg/2 ml เงื่อนไข ใช้รักษา drug-resistant tuberculosis หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 5.1.7 Aminoglycosides	Sterile sol	ค
5.1.10	<u>Antileprotic drugs</u>		
1	Dapsone tab 100 mg	tab	ก
5.2	<i>Anthelmintics</i>		
1	Albendazole 200 mg	tab	ก
2	Albendazole 400 mg/20 ml ขวด 20 ml	susp	ก
3	Diethylcarbamazine citrate	tab	ก
5.3	<i>Antivirals</i>		
5.3.1	<u>Non-antiretrovirals</u>		
1	Acyclovir 400 mg หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่เป็นโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) ชนิดไม่รุนแรง	tab	ก
2	Oseltamivir 75 mg เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินโรครุนแรง หรือแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินโรครุนแรง 2. ใช้สำหรับรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการมาไม่เกิน 48 ชั่วโมง หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัส หรือป้องกันหลังการสัมผัส	cap	ค
3	Acyclovir cream 1 gm	cream	NED

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
4	FAVIRAVIR 200 mg	tab	NED
5	MOLNUPIRAVIR 200 mg	tab	NED
6	REMDESIVIR 100 mg	tab	ก
5.3.2	Antiretrovirals ยากลุ่มนี้เป็นยาตามนโยบายเอดส์แห่งชาติของกรมควบคุมโรค สำนักงาน ประกันสังคม สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง		
1	Dolutegravir (DTG) FC tab 50 mg หมายเหตุ 1. ใช้ยานี้ตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอช ไอวีประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน 2. ผู้ป่วยเดิมที่ดื้อยาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนส่งใช้นี้	tab	ค
2	Lamivudine (3TC) tab 150 mg	tab	ก
3	Lamivudine (3TC) oral sol 10 mg/ml x 60 ml เงื่อนไข ใช้เป็น prophylactic therapy ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ที่จะได้รับ ยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกัน โดยใช้ยาในระยะสั้น หรือใช้ในเด็กที่ได้ รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่ตรวจพบ HBsAg-positive หรือ ตรวจพบ anti-HBc positive ร่วมกับ HBsAg-negative	syr	ก
4	Rilpivirine (RPV) tab 25 mg	tab	ข
5	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) tab 300 mg	tab	
6	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg + Lamivudine (3TC) 300 mg + Dolutegravir (DTG) 50 mg tab หมายเหตุ ให้ใช้นี้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาสูตร TAF/FTC/DTG ได้	tab	ก
7	Zidovudine (AZT) 100 mg	cap	ก
8	Zidovudine (AZT) oral mg/ml x 60 ml	syr	ก
9	EFAVIRENZ 600 mg	tab	ก
10	EFAVIRENZ 200 mg	CAP	ก
11	EFAVIRENZ 50 mg	tab	ก
12	ABACAVIR (ABC) 300 MG เงื่อนไข 1. ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้น้ำยา tenofovir หรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ สามารถใช้น้ำยา tenofovir ได้ (ยา tenofovir ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ผลต่อไต และผลต่อ bone density) 2. ใช้เป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสูตร ยาด้านไวรัสดื้อยา ในกรณีที่การรักษา ล้มเหลวจากเชื้อดื้อยาด้านไวรัส สูตรก่อน โดยต้องมีการตรวจ genotypic resistance ที่ไวกับยา abacavir และเชื้อไวต่อยาอื่นในสูตรอย่างน้อย 2 ชนิด 3. ใช้กับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีอายุ 3 เดือนขึ้นไป	tab	ค

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	หมายเหตุ 1. ผู้ป่วยที่ได้รับยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ได้โดยเฉพาะใน 6 สัปดาห์แรก อาการส่วนใหญ่ มักจะมีหลายระบบร่วมกัน หากพบอาการอย่างน้อย 2 ข้อดังต่อไปนี้ 1.1 ไข้ 1.2 ผื่น 1.3 คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง 1.4 อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ (arthralgia) 1.5 หอบเหนื่อย ไอ เจ็บคอ ให้หยุดยา abacavir ทันทีและห้ามให้ยา abacavir อีก (ห้าม rechallenge) เพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 2. การตรวจ HLA B*5701 ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ 3. ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ยาสูตร dolutegravir bas ผู้ป่วยที่จะใช้นี้เป็นสูตรแรกควรมีค่า baseline HIV-1 RNA viral load น้อยกว่า 100,000 copies/ml (เนื่องจากยามีประสิทธิภาพน้อยกว่า tenofovir เมื่อให้ผู้ป่วยที่มี baseline HIV-1 RNA viral load มากกว่า 100,000 copies/ml) หรือเป็นไปตามแนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ฉบับปัจจุบัน		
13	ATAZANAVIR 300 mg	cap	ค
14	FTC(EMTRICITABINE) 200 mg+TDF 300 mg	tab	ก
15	LOPINAVIR(80 MG)+RITONAVIR(20 MG)	tab	ค
16	NEVIRAPINE 10 mg./ml. (60 mL.)	syrup	ก
17	NEVIRAPINE 200 mg	tab	ก
18	RITONAVIR 100 mg	tab	ค
19	TENOFOVIR 300 mg+ EMTRICITABINE 200 mg+ EFAVIRENZ 600 mg	tab	ก
20	Zidovudine (AZT300 mg)+ Lamivudine 3TC(150 mg)	tab	ก
5.3.3	<u>Viral hepatitis</u>		
1	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) เงื่อนไข 1. ใช้รักษาหรือควบคุมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (chronic hepatitis B virus infection) ในหญิงตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับ decompensat cirrhosis (Child–Pugh score B or C) ที่ตรวจพบ HBV DNA 3. ใช้เป็น rescue therapy ในผู้ป่วยอายุ 2-18 ปี ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง กรณี ที่ต้องการรักษาด้วยยากกลุ่ม nucleoside analogs เช่น Lamivudine, Telbivudine, หรือ Entecavir เป็นต้น และไม่สามารถใช้ Tenofovir alafenamide (TAF) ได้ 4. ใช้ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังโดยมีค่า eGFR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 mL/min/1.73 m² และยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไต คำแนะนำ 1. ให้ตรวจ HIV serology negative 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือนก่อนเริ่มการรักษา ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น เร่งด่วน (ผู้ป่วยที่มีภาวะตับวาย: hepatic decompensation) ให้มีผล	tab	ง

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	HIV serology negative ในครั้งแรก 2. ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจ anti-HIV อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนำให้รักษาร่วมโดยแพทย์สาขาโรคติดเชื้อและแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร หมายเหตุ แนะนำให้ติดตามการทำงานของไต ตามแนวทางการรักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรังของประเทศไทย		
2	Lamivudine (3TC) เงื่อนไข ใช้เป็น prophylactic therapy ในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ที่จะได้รับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกันโดยใช้ยาในระยะสั้น หรือใช้ในเด็กที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่ตรวจพบ HBsAg-positive หรือตรวจพบ anti-HBc positive ร่วมกับ HBsAg-negative	syr	ง
5.4	Antifungal drugs		
1	Fluconazole 200 mg เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับ invasive fungal infection บางชนิด 2. ใช้สำหรับ dermatomycoses	cap	ก
2	Ketoconazole 200 mg	tab	ก
5.5	Antiseptics		
1	Ethyl alcohol 70% ขวด 450 ml	sol	ก
2	Ethyl alcohol 70% ขวด 60 ml	sol	ก
3	Ethyl alcohol 95% ขวด 450 ml	sol	ก
4	Povidone-iodine 10 %w/v ขวด 15 ml	sol	ก
5	Povidone-iodine 10 %w/v ขวด 450 ml	sol	ก
6	Waterless hand wash (alcohol gel)	gel	ก
7	Hydrogen peroxide 6%	sol	ก
8	Chlorhexidine gluconate 4% x 60 ml หมายเหตุ Chlorhexidine gluconate 5% เป็นชนิดเข้มข้นที่ใช้เตรียม Chlorhexidine แบบ freshly prepared	sol	ก
5.6	Antiprotozoal drugs (ยาสันนิน)		
5.6.1	Antimalarials		
1	Chloroquine phosphate 250 mg	tab	ก
2	Primaquine phosphate 15 mg	tab	ก
3	Primaquine phosphate 7.5 mg	tab	ก
4	ARTESUNATE 60 mg inj	sterile pwdr	ค

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
5.6.2	Other antiprotozoal drugs		
1	Metronidazole เมโทรนิดาโซล ใช้สำหรับ amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis	tab (as base), sterile sol (as base)	ก
6) กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)			
6.1 Drugs us in diabetes			
6.1.1	Oral antidiabetic drugs		
1	Glipizide 5 mg	tab	ก
2	Metformin hydrochloride 500 mg	tab	ก
3	Metformin hydrochloride 850 mg	tab	ก
4	Pioglitazone hydrochloride 30 mg เมทโกลิทาโซน ใช้เป็นยาทางเลือก ภายหลังการใช้ยา Metformin หรือยากกลุ่ม Sulfonylureas คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีหัวใจล้มเหลวในระดับที่รุนแรง (NYHA ในระดับ 3 และ 4 ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 2. ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่กำลังเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ	tab	ข
6.1.2	Insulins		
1	Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin) inj 100 IU/ml x 10 ml	sterile sol	ก
2	Biphasic isophane insulin (Mixtard) Isophane insulin (NPH) 70% + Soluble insulin (RI) 30% inj 100 IU/ml x 3 ml	sterile sol	ก
3	Biphasic isophane insulin (Mixtard) Isophane insulin (NPH) 70% + Soluble insulin (RI) 30% inj 100 IU/ml x 10 ml	sterile sol	ก
4	Soluble insulin (Neutral insulin; insulin injection) (RI) inj 100 IU/ml x 10 ml	sterile sol	ก
6.2 Corticosteroids/Asthma/COPD			
1	Dexamethasone sodium phosphate inj. 5 mg/ml	sterile sol	ก
2	Dexamethasone tab 4 mg	tab	ก
2	Prnisolone 5 mg	tab	ก
3	Hydrocortisone sodium succinate for inj 100 mg	Sterile powder	ก
4	Triamcinolone acetone inj 10 mg/ml คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ควรระวังการฉีดในตำแหน่งหรือรอยโรคที่มีการติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อ	sterile susp	ค

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	2. กรณีฉีดเข้าข้อ โดย 2.1 ไม่ควรฉีดเข้าข้อใหญ่ในคราวเดียวกันเกิน 2 ข้อ ยกเว้นผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง 2.2 การฉีดยาเข้าข้อเดียวกันควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน 3. กรณีฉีดเข้ารอยโรค (intralesional injection) สำหรับโรคผิวหนัง ควรฉีดเข้าในชั้นหนังแท้ หลีกเลี่ยงการฉีดเข้าในชั้นหนังกำพร้าหรือไขมันใต้ผิวหนัง เพราะทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ผิวหนังบาง เป็นต้น		
6.3	Thyroid and antithyroid drugs		
6.3.1	<u>Thyroid hormones</u>		
1	Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) 100 mcg	tab	ก
6.3.2	<u>Antithyroid drugs</u>		
1	Propylthiouracil 50 mg	tab	ก
2	Thiamazole (Methimazole) 5 mg	tab	ก
6.4	Drugs affecting bone metabolism (ยาสับส่น)		
1	Alendronate sodium tab 70 mg	tab	ง
7)	กลุ่มยา Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders		
7.1	Drugs us in obstetrics		
7.1.1	<u>Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics</u>		
1	Oxytocin	sterile sol	ก
7.1.2	<u>Myometrial relaxants</u>		
1	Terbutaline sulfate 0.5 mg/ml	sterile sol	ก
7.2	Treatment of vaginal and vulval conditions		
1	Clotrimazole 100 mg	vaginal tab	ก
2	Nystatin 100,000 IU	Vaginal tab	ก
7.3	Sex hormones		
	<u>Female sex hormones</u>		
1	Norethisterone 5 mg	tab	ก
7.4	Contraceptives		
1	Ethinylestradiol 30 mcg + Levonorgestrel 150 mcg	tab	ก
2	Lynestrenol 0.5 mg	tab	ข
3	Mroxypogesterone acetate 150 mg/3 ml	sterile susp	ก
5	Etonogestrel 68 mg/rod	Implant 1 rod	ก
6	LEVONORGESTREL 0.75 mg เจ็อนไซ Levonorgestrel รูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับคุมกำเนิดกรณีฉุกเฉินเท่านั้น	tab	ก
7	MULTILOAD CU 375 SL (ห่วงอนามัย)	ห่วงอนามัย	-
8	Hydroxyprogesterone caproate inj 250 mg/ml	sterile susp	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
7.5	Drugs for genito-urinary disorders		
	<u>Drugs for benign prostatic hyperplasia</u>		
1	Alfuzosin hydrochloride 10 mg เจ็อนไซ ใช้กับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือ ไม่สามารถทนต่อการไม่พึงประสงค์จากการรักษาด้วยยากกลุ่ม non-uroselective alpha-1 adrenergic blockers	prolong SR tab	ง
2	Doxazosin mesilate 2 mg	Immiate release tab	ค
3	Finasteride 5 mg เจ็อนไซ ใช้กับผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตที่มีอาการผิดปกติในการปัสสาวะระดับปานกลางถึงรุนแรง และมีขนาดของต่อมลูกหมากมากกว่า 40 ml หรือมีระดับ prostate specific antigen (PSA) concentrations มากกว่า 1.4 ng/ml หมายเหตุ finasteride ขนาด 1 mg ที่ใช้รักษาศีรษะล้านไม่จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	tab	ง
7.6	Drugs us in obstetrics		
1	Methylethergometrine maleate inj 200 mcg/ml	sterile sol	ก
2	Oxytocin inj 10 u/ml	sterile sol	ก
3	Misoprostol 200 mcg	tab	NED
8)	Malignant disease and immunosuppression		
	<u>Drugs affecting the immune response</u>		
1	Dexamethasone 4 mg	Tab (as base)	ก
2	Dexamethasone sodium phosphate 5 mg/ml	sterile sol	ก
3	Prnisolone 5 mg	tab	ก
9)	กลุ่มยาประเภทสารอาหารและที่มีผลต่อระบบเลือด (Nutrition and blood)		
9.1	Whole blood, blood products and drugs us in some blood disorders		
	<u>Drugs us in hypoplastic, hemolytic and renal anemias</u>		
1	Folic acid 5 mg	tab	ก
9.2	Fluids and electrolytes		
1	Glucose 50% ขวด 50 ml	sterile sol	ก
2	Sodium Chloride 0.9% ขวด 100 ml	sterile sol	ก
3	Sodium Chloride 0.9% ขวด 1000 ml	sterile sol	ก
4	Sodium Chloride for irrigate 0.9% ขวด 500 ml	sol	ก
5	Sodium Chloride for irrigate 0.9% ขวด 1000 ml	sol	ก
6	Sterile water for injection ขวด 100 ml	sterile sol	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
7	Sterile water for injection ขวด 1000 ml	sterile sol	ก
8	Sterile water for irrigate ขวด 1000 ml	sol	ก
9	Glucose powder	powder	NED
10	Glucose 5% + Sodium chloride 0.9% inj. x 1,000 ml (D-5-S)	sterile sol	ก
11	Glucose 5% + Sodium chloride 0.45% inj. x 500 ml (D-5-S/2)	sterile sol	ก
12	Glucose 5% + Sodium chloride 0.45% inj. x 1,000 ml (D-5-S/2)	sterile sol	ก
13	Glucose 5% + Sodium chloride 0.3% inj. x 500 ml (D-5-S/3)	sterile sol	ก
14	Glucose 5% + Sodium chloride 0.225% inj. x 500 ml (D-5-S/4)	sterile sol	ก
15	Glucose 5% + Sodium chloride 0.18% inj. x 500 ml (D-5-S/5)	sterile sol	ก
16	Potassium chloride inj. 20 mEq/10 ml (1.5 g) (KCL)	sterile sol	ก
17	Potassium chloride Elixir. 500 mg/5 ml (6.67 mEq/5 ml) คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ควรรับประทานยา potassium chloride หลังอาหารทันที ในกรณียาเม็ดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 180 มิลลิลิตรและห้ามเอนตัวนอนลงอย่างน้อย 30 นาทีหลังรับประทานยาเม็ด 2. ห้ามใช้ยา potassium chloride ชนิด elixir กับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เนื่องจากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ	elixir	ก
18	Potassium chloride tab. 500 mg/tab คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ควรรับประทานยา potassium chloride หลังอาหารทันที ในกรณียาเม็ดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 180 มิลลิลิตรและห้ามเอนตัวนอนลงอย่างน้อย 30 นาทีหลังรับประทานยาเม็ด 2. ห้ามใช้ยา potassium chloride ชนิด elixir กับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เนื่องจากมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ	EC tab	ก
19	Calcium chloride + Potassium chloride + Sodium chloride + Sodium acetate (Ringer's acetate) inj. x 1000 ml (LRI)	sterile sol	ก
20	Sodium bicarbonate inj. 7.5% x 50 ml (44.6 mEq)	sterile sol	ก
21	Sodium bicarbonate tab. 300 mg/tab.	tab	ก
22	Sodium chloride inj. 0.45% x 1000 ml	sterile sol	ก
23	Sodium chloride inj. 0.9% x 500 ml	sterile sol	ก
24	Sodium chloride inj. 3% x 500 ml	sterile sol	ก
25	Water for injection x 10 ml	sterile sol	ก
26	Water for injection x 100 ml	sterile sol	ก
27	Water for injection x 1000 ml	sterile sol	ก
28	Water for irrigate x 1000 ml	sol	ก
29	Glucose 5% in Water Injection x 100 ml (D-5-W)	sterile sol	ก
30	Glucose 5% in Water Injection x 500 ml (D-5-W)	sterile sol	ก
31	Glucose 10% + Sodium chloride 0.18% inj x 500 ml (D-10-S/5)	sterile sol	ก
32	Glucose 10% in Water Injection x 500 ml (D-10-W)	sterile sol	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
33	Calcium polystyrene sulfonate (Kalimate) 5 g/ซอง	Oral powdr	ข
9.3	Minerals		
1	Calcium carbonate 1,250 mg (Elemental calcium 500 mg)	tab	ก
2	Ferrous fumarate 76 mg/5 ml ขวด 60 ml (Elemental iron 25 mg/5 ml)	oral sol	ข
3	Ferrous fumarate 200 mg (Elemental iron 65 mg)	tab	ข
9.4	Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers		
1	Ferrous fumarate 200 mg (Elemental iron 65 mg) คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน 2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย	tab	ก
2	Folic acid 5 mg เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับเสริมโฟเลตตลอดการตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับเสริมโฟเลตในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร 3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรือปากแหว่งเพดานโหว่ ควรใช้ความแรง 5 mg	tab	ก
3	Iodine 0.15 mg (as Potassium iodide 0.196 mg) + Iron 60.81 mg (as Ferrous fumarate 185 mg) + Folic acid 0.4 mg (Triferdine)	tab	ก
9.5	Vitamins Multivitamins ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีวิตามินเป็นส่วนประกอบ เท่านั้น การผสมแร่ธาตุ (mineral) หรือตัวยาสำคัญอื่นๆ ไม่ถือเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		
1	Multivitamins ขวด 60 ml ใน 5 ml ประกอบด้วย - Vitamin A 1,000 IU - Vitamin D3 : 200 IU - Vitamin B1 : 2 mg - Vitamin B2 : 1 mg - Vitamin B3 : 5 mg - Vitamin B6 : 1 mg - Vitamin B12 : 10 mcg - Lysine 100 mg หมายเหตุ 1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 1 – 8 ปี 2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วย (ซอง) ที่รับประทานต่อครั้ง	syr	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
2	Multivitamins ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย - Vitamin A 2,500 IU - Vitamin D : 300 IU - Vitamin B1 : 1 mg - Vitamin B2 : 0.5 mg - Vitamin B3 : 7.5 mg - Vitamin C : 15 mg หมายเหตุ 1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็ก อายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่ 2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวน หน่วย (เม็ด) ที่รับประทานต่อครั้ง	tab	ก
3	Vitamins B complex ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย - Vitamin B1 : 1.5 mg - Vitamin B2 : 1.7 mg - Vitamin B3 : 20 mg - Vitamin B5 : 6 mg - Vitamin B6 : 2 mg - Vitamin B12 : 10 mcg - Biotin 150 mcg - Folic acid 300 mcg หมายเหตุ 1. มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็ก อายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่ 2. ปริมาณที่กำหนดนี้เป็นการกำหนดปริมาณยาต่อวัน โดยไม่จำกัดจำนวน หน่วย (เม็ด) ที่รับประทานต่อครั้ง	tab	ก
4	Vitamins B6 (Pyridoxine hydrochloride) 50 mg คำเตือนและข้อควรระวัง การรับประทานวิตามิน B6 ขนาดตั้งแต่ 200 มิลลิกรัมต่อวัน ขึ้นไปเป็น เวลานาน มีความสัมพันธ์กับการเกิด neuropathy ได้	tab	ก
5	Vitamins C 100 mg	tab	ก
6	Vitamin B1-6-12 ใน 1 เม็ดประกอบด้วย -Vitamin B1 : 100 mg -Vitamin B6 : 7.5 mg -Vitamin B12 : 75 mcg	tab	NED
7	Folic acid tab 5 mg	tab	ก
8	Vitamin B complex inj 1 ml	sterile sol	ข

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	หมายเหตุ มีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันในเด็กอายุ 9 - 12 ปี และผู้ใหญ่		
9	Vitamin D ₂ (Ergocalciferol) 20,000 u เงื่อนไข เป็น first -line drug ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามิน D	cap	ก
10	Vitamin K ₁ (Phytomenadione) inj 1mg/ml	sterile sol	ก
11	THIAMINE (VIT B1 INJ.) 100 mg.	sterile sol	ก
9.6	Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers		
1	Ferrous fumarate 200 mg (Elemental iron 65 mg) คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน 2. ระวังการเกิดพิษในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของโรคธาลัสซีเมีย	tab	ก
2	Folic acid tab 5 mg เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับเสริมโฟเลตตลอดการตั้งครรภ์ 2. ใช้สำหรับเสริมโฟเลตในช่วง 6 เดือนแรกของการให้นมบุตร 3. กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เคยมีประวัติตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรที่มีภาวะ neural tube defect หรือปากแหว่งเพดานโหว่ควรใช้ความแรง 5 mg	tab	ก
10)	กลุ่มยาที่มีผลต่อระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ (Musculoskeletal and joint diseases)		
10.1	Drugs us in rheumatic diseases and gout		
10.1.1	<u>Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)</u>		
1	Aspirin (Acetylsalicylic acid) 300 mg	EC tab	ก
2	Diclofenac sodium 25 mg	EC tab	ก
3	Naproxen 250 mg	tab	ก
4	Ibuprofen 200 mg คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อด้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน 2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 3. ระวังการเกิดพิษในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก	EC tab	ก
5	Ibuprofen 400 mg คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อด้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน	EC tab	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก		
6	Ibuprofen 100 mg/5 ml ขวด 60 ml คำเตือนและข้อควรระวัง 1. ไม่ควรใช้ ibuprofen ระยะยาวในผู้ป่วยที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากอาจมีผลต่อด้านประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจของยาแอสไพริน 2. ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก	Suspension	ก
7	Mefenamic 250 mg	cap	NED
8	dicloFENAC inj. 75 mg	sterile sol	ก
10.1.2	<u>Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia</u>		
1	Colchicine 0.6 mg คำเตือนและข้อควรระวัง ยานี้มีผลข้างเคียงทำให้อุจจาระร่วงและอาจทำให้กล้ามเนื้อลายสลาย (rhabdomyolysis) จึงควรระวัง การใช้ร่วมกับยาที่ทำให้กล้ามเนื้อลายสลายเช่น ยาในกลุ่ม statins เป็นต้น	tab	ก
2	Allopurinol 100 mg คำเตือนและข้อควรระวัง การลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงต่อการเกิด severe cutaneous adverse reactions (SCAR) จากการใช้ allopurinol ทำได้โดย 1. ฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทุกรายในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกของการให้ยา 2. ควรเริ่มใช้ยาในขนาดต่ำและค่อยๆ ปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นช้าๆ ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีการทำงาน ของไตบกพร่อง	tab	ก
10.1.3	<u>Opioids</u>		
1	Tramadol 50 mg	cap	ค
10.2	Drugs us in neuromuscular disorders		
10.2.1	<u>Skeletal muscle relaxants</u> 1. ยากลุ่มนี้ใช้บรรเทาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่เป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เช่น บาดทะยัก การบาดเจ็บของไขสันหลัง และ multiple sclerosis 2. ไม่ใช้ยากลุ่มนี้กับอาการหดเกร็งกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬาหรือการบาดเจ็บ 3. ควรใช้ยากลุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการลด muscle tone อาจเพิ่ม disability ให้กับผู้ป่วย		
1	Diazepam 2 mg	tab	ก
2	Diazepam 5 mg	tab	ก
3	Diazepam inj. 5 mg/ml	sterile sol	ก
4	Tolperisone 50 mg	tab	NED

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
10.2.2	<u>Neuropathic pain</u>		
1	Gabapentin 100 mg	cap	ง
10.3	<i>Drugs for relief of soft-tissue inflammation</i>		
10.3.1	<u>Rubifacients</u>		
1	Methyl Salicylate Cream Compound	cream	ก
11)	Eye		
11.1	<i>กลุ่มยาต้านการติดเชื้อที่ตา (Anti-infective eye preparations)</i>		
11.1.1	<u>Antibacterials and eye wash solution</u> 1. ใช้เป็นยาสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น 2. ควรใช้ยาให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อ เช่น ชนิดกรัมบวก หรือกรัมลบ		
1	Boric acid 3% ขวด 150 ml	eye wash sol	ก
2	Chloramphenicol 1 % w/w 5 g	eye oint	ก
3	Polymyxin B sulfate 5000 iu + Neomycin sulfate 2 mg + Gramicidin 0.025 mg (per 1 ml) (Poly-oph) หมายเหตุ ยาที่มีส่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลให้เกิดการดื้อของเชื้อในทาง systemic จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น	eye drop	ค
4	Oxytetracycline/Polymyxin B sulfate 3.5 gm (Terramycin)	Eye oint	NED
11.1.2	<u>Antibacterials with corticosteroids</u> 1. การใช้ยากลุ่มนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพราะยาที่มีใช้จำกัด หากใช้ไม่ถูกต้องอาจไม่ปลอดภัย 2. ห้ามใช้ในอาการตาแดงที่ยังมิได้รับการตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ชัดเจน เพราะอาจเกิดอันตรายได้เช่น การใช้ในอาการตาแดงที่เกิดจากเชื้อ herpes simplex virus อาจทำให้เกิดแผลที่กระจกตาไปจนถึงตาบอดได้ เป็นต้น 3. ใช้สำหรับการอักเสบรุนแรงในลูกตาส่วนหน้าหรือหลังผ่าตัด และป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเสี่ยง		
1	Dexamethasone/Neomycin sulfate (1 mg/3.5 mg ต่อ ml) (Dex-oph)	Eye/ear drop	ค
11.2	<i>Mydriatics and cycloplegics</i>		
1	Atropine sulfate eye drop 1% x 5 ml	eye drop	ค
11.3	<i>Antihistamine and cholinergic preparations</i>		
1	Antazoline hydrochloride 0.05%+ Tetrahydrozoline hydrochloride 0.04% (Hista-oph)	eye drop	ก
11.4	<i>Local anesthetic</i>		
1	Tetracaine hydrochloride 0.5 % เจือจาง ห้ามให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน	Eye drop	ก
11.5	<i>Tear deficiency, ocular lubricants and astringents</i>		
1	Hypromellose (with preservative) 0.3 % w/v (Miltear MD)	Eye drop	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
12	Ear, nose, oropharynx, oral cavity and the rectal		
12.1	<i>Drugs acting on the ear</i>		
	<u>Otitis externa and otitis mia</u>		
1	Chloramphenicol 1%	ear drop	ก
12.2	<i>Drugs acting on the nose</i>		
	<u>Drugs us in nasal allergy</u>		
1	Fluticasone furoate 27.5 mcg/spray ขวด 120 sprays (Avamys) เงื่อนไข ใช้กับผู้ป่วยอายุ 2 ปีขึ้นไปในข้อบ่งใช้ 1. โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดตามฤดูกาลและตลอดปี 2. เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้	Nasal spray	ค
12.3	<i>Drugs acting on the oropharynx and oral cavity</i>		
12.3.1	<u>Drugs us in treatment of oral ulcer</u>		
1	Triamcinolone acetonide 0.1% 1 g (Kenalog)	Oral paste	ก
2	Glycerin borax ขวด 15 ml	sol	ก
3	Chlorhexidine gluconate 0.12% w/v mouthwash ขวด 250 ml	mouthwash sol	ก
4	Boric acid-Thymol m/w ขวด 60 ml (Dobell)	Sol	NED
12.3.2	<u>Drugs us in prevention and treatment of dental plaque and caries</u>		
1	Chlorhexidine gluconate 0.12% w/v mouthwash ขวด 250 ml	mouthwash sol	ก
12.3.3	<u>Other dental preparations</u>		
1	Epinephrine (Adrenaline) inj. 1 mg/ml	sterile sol	ก
2	Sodium Chloride 0.9% ขวด 100 ml	sterile sol	ก
3	Sodium chloride inj. 0.9% x 500 ml	sterile sol	ก
4	Sodium Chloride 0.9% ขวด 1000 ml	sterile sol	ก
12.4	<i>Drugs acting on the rectal</i>		
	<u>Antihaemorrhoidal preparation</u>		
1	Hydrocortisone/Cinchocain HCL (PROCTOSYL) (5 mg/5 mg)	suppositories	NED
	<u>Laxatives</u>		
1	Sodium chloride 15% w/v (UNISON) ขนาด 133 ml	rectal sol	ก
2	Sodium chloride 15% w/v (UNISON) ขนาด 20 ml	rectal sol	ก
13	Skin		
13.1	<i>Anti-infective skin preparations</i>		
13.1.1	<u>Antibacterial preparations</u>		
1	Sulfadiazine silver 1% 30 g	cream	ก
2	Chlorhexidine scurb 4% ขวด 450 ml	sol	ก
3	Framycetin sulfate 1% (Sofatulle)	Gauze dressing	NED
4	Chlorhexidine gluconate 1% ขวด 50 g	cream	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
13.1.2	<i>Antifungal preparations</i>		
1	Benzoic acid + Salicylic acid (Whitfield's ointment)	oint	ก
2	Clotrimazole 1% 5 g	cream	ก
13.1.3	<i>Parasitocidal preparations</i>		
1	Benzyl benzoate 25% ขวด 450 ml	emulsion	ก
13.2	<i>Topical antipruritics</i>		
1	Calamine ขวด 60 ml หมายเหตุ หากในสูตรตำรับยา มี phenol เป็นส่วนประกอบ ต้องมีความเข้มข้นของ phenol ไม่เกิน 0.5 - 1%	lotion	ก
13.3	<i>Topical corticosteroids</i> ควรระมัดระวังการใช้ยาทาสเตียรอยด์ที่มีความแรงสูงและสูงมากในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผิวหนัง บริเวณรอบดวงตา ข้อพับต่างๆ เยื่อหู ปาก ทวาร และอวัยวะเพศ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีผิวหนังบางจึงอาจมีผลข้างเคียง ต่อผิวหนังบริเวณที่ทายา และยาอาจถูกดูดซึมทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็น systemic side-effect ได้		
1	Betamethasone valerate 0.1% 5 gm	cream	ก
2	Triamcinolone acetonide 0.02% 5 g	cream	ก
3	Triamcinolone acetonide 0.1% 5 g	cream	ก
4	Betamethasone/Neomycin (1 mg/5 mg) 5 gm	cream	NED
13.4	<i>Moisturizer/Emollients and protectives</i>		
1	Olive oil ขวด 450 ml	oil	ก
2	Zinc oxide 5 gm	paste	ก
13.5	<i>Preparations for warts and calluses</i>		
1	Salicylic acid 25 gm ขวด 100 ml	sol	ก
13.6	<i>Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)</i>		
1	Coal tar shampoo 1 % ขวด 120 ml	shampoo	ก
14	<i>Immunological products and vaccines</i>		
1	Diphtheria-Tetanus vaccine (dT)	Inj.	ก
2	Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine(whole cell) (DTPw)	Inj.	ก
3	Diphtheria-Tetanus-Pertussis + Hepatitis B + Haemophilus influenza type b vaccine (DTP-HB-Hib)	Inj.	ก
4	Hepatitis B vaccine 20 mcg/ml (HBV)	Inj.	ก
5	Japanese encephalitis vaccine, live attenuat (Live Attenuat JE vaccine)	Inl.	ก
6	BCG vaccine (Bacillus Calmette-Guérin)	Inj.	ก
7	Measles-Mumps-Rubella vaccine (MMR)	Inj.	ก
8	Poliomyelitis vaccine, live attenuat (OPV) ชนิด bivalent และ trivalent	oral sol/susp	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
9	Inactivat poliovirus vaccine (IPV) (เฉพาะชนิดที่เป็นวัคซีนเดี่ยว)	Inj.	ก
10	Rabies immunoglobulin, horse inj 1,000 iu/5 ml (ERIG)	Inj.	ก
11	Rabies vaccine inj 0.5 ml (PVRV, Spea) ยกเว้นชนิด human diploid cell vaccine (HDCV) เงื่อนไข 1. ใช้สำหรับ post-exposure protection 2. ใช้สำหรับ pre-exposure protection ในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง	Inj.	ก
12	Tetanus antitoxin, horse inj 250 iu/2 ml (TAT)	Inj.	ก
13	Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดในแต่ละปี เงื่อนไข 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และเบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 5. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 6. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 7. โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 8. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร	Inj.	ก
14	Hepatitis B immunoglobulin, human inj 180 u/ml (HBIG) เงื่อนไข ใช้ร่วมกับการฉีด Hepatitis B vaccine เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ทารกแรกเกิดที่มารดามี HBsAg เป็นบวก 2. เมื่อผิวหนังหรือเยื่อเมือกสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มี HBsAg เป็นบวก เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่เกิดอุบัติเหตุสัมผัสโรคจากการทำงานตามแนวปฏิบัติของสถานพยาบาลนั้น ๆ หรือผู้ที่ถูกข่มขืน 3. ป้องกันผู้ป่วยจากการกลับเป็นโรคตับอักเสบบีซ้ำหลังจากได้รับการเปลี่ยนตับแล้ว หมายเหตุ ในทารกแรกเกิดซึ่งมารดามีอายุครรภ์ปกติ การให้วัคซีนภายใน 24 ชั่วโมงสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากอยู่แล้ว การให้ HBIG ไม่ทำให้การป้องกันสูงขึ้น	Inj.	ค
15	HPV VACCINE (GARDASIL) 0.5 ml (เฉพาะรณรงค์)	Inj.	ก
16	Meningo coccus (MENGEVAX) (วัคซีนไขก้างหลังแอ่น) vaccine (เฉพาะรณรงค์)	Inj.	ก
17	Measles -Rubella vaccine (MR) (เฉพาะรณรงค์)	Inj.	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
15	Anaesthesia		
15.1	General anaesthesia		
	<u>Local anaesthesia</u>		
1	Lidocaine hydrochloride 1% 50 ml	sterile sol (local infiltration)	ก
2	Lidocain hydrochloride jelly 2% 30 gm	gel	ก
3	Lidocain spray 10%	spray	ก
4	Lidocaine hydrochloride inj 2% x 50 ml	sterile sol (local infiltration)	ก
5	Lidocaine hydrochloride viscous 2% x 100 ml	sol	ก
6	Lidocaine hydrochloride 2% + Epinephrine 1:200,000 inj x 50 ml	sterile sol (local infiltration)	ก
16	Drugs us in poisoning and toxicology ยาในกลุ่มนี้หลายชนิดไม่ปรากฏเป็นยาในบัญชีนี้ เนื่องจากเป็นยากำพร้า (orphan drugs) ที่มีปัญหาการจัดหาและไม่มีทะเบียนตำรับยา แต่ควรส่งเสริมให้มีการจัดหามาใช้และควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์พิษวิทยา เช่น ศูนย์พิษวิทยา ร.พ.รามธิบดี โทร.1367 ศูนย์พิษวิทยา ร.พ.ศิริราช โทร.0 2419 7007 คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 125, 130, 131 (ในกรณีฉุกเฉินที่มีพิษกัด)		
16.1	Snakebite poisoning		
1	Antivenom sera, Cobra (งูเห่า) for inj 600 mcg	Inj.	ก
2	Antivenom sera, Malayan pit viper (งูกะปะ) for inj 1.6 mg	Inj.	ก
16.2	Mushroom and microbial poisoning		
1	Acetylcysteine (N-acetylcysteine) inj 300 mg/3 ml เจือจาง ใช้รักษาภาวะพิษต่อตับจากเห็ดพิษกลุ่มที่มีอะมาทอกซิน (amatoxin containing mushrooms)	sterile sol	ก
16.3	Pesticide & herbicide poisoning		
1	Atropine sulfate 0.6 mg/ml inj. เจือจาง ใช้ต้านพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis	sterile sol	ก
2	Pralidoxime chloride (2-PAM) for inj 1 g เจือจาง ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจาก organophosphates	sterile powder	ก
16.4	Corrosive Poisoning		
1	Calcium gluconate inj 10% x 10 ml เจือจาง ใช้บำบัดพิษจาก hydrofluoric acid	sterile sol	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	หมายเหตุ ให้ฉีดเข้าหลอดเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้		
16.5	Cyanide and Hydrogen sulfide poisoning		
1	Sodium nitrite 300 mg/10 ml ยากำพรั้ว เงื่อนไข ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจากไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ คำเตือนและข้อควรระวัง การใช้ยาปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะ cardiovascular collapse, methaemoglobinaemia และ อาจเสียชีวิตได้	sterile sol	ค
2	Sodium thiosulfate 250 mg ยากำพรั้ว เงื่อนไข ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจากไซยาไนด์	sterile sol	ค
16.6	Drug poisoning		
1	Acetylcysteine (N-acetylcysteine) inj 300 mg/3 ml เงื่อนไข ใช้แก้พิษจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด	sterile sol	ก
2	Calcium gluconate inj 10% x 10 ml เงื่อนไข ใช้บำบัดพิษจาก calcium channel blockers และ beta blockers หมายเหตุ ให้ฉีดเข้าหลอดเลือดอย่างช้า ๆ การฉีดเร็วอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้	sterile sol	ก
3	Naloxone hydrochloride 0.4 mg/ml เงื่อนไข ใช้บำบัดอาการพิษเฉียบพลันจากสารกลุ่ม opioids หรือยา clonidine	sterile sol	ก
4	Sodium bicarbonate inj 7.5% x 50 ml (44.6 mEq) เงื่อนไข ใช้บำบัดภาวะ hyperkalemia หรือพิษเฉียบพลันจากสาร tricyclic antidepressants หรือ antiarrhythmics type I	sterile sol	ก
5	Vitamin K ₁ (Phytomenadione) inj 10 mg/ml เงื่อนไข ใช้บำบัดภาวะยา anticoagulants (coumarin derivatives) เกินขนาด	sterile sol	ก
16.7	Drugs us for absorption inhibition and elimination of toxin		
1	Activated charcoal 50 gm เงื่อนไข ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไปที่ได้รับในทางเดินอาหาร	pwdr	ก
2	Sodium bicarbonate inj 7.5% x 50 ml (44.6 mEq)	sterile sol	ก

No.	กลุ่มยา/กลุ่มย่อย/generic name	รูปแบบ	ประเภท
	เจือจาง ใช้รับประทานให้เป็นอย่างอื่น เพื่อเร่งการกำจัดสารพิษ เช่น salicylates เป็นต้น		
17	Miscellaneous		
1	Ammonia ขวด 450 ml	sol	ก
2	Lubricate jelly 50 gm	gel	NED

บัญชียาสมุนไพรในโรงพยาบาลรัษฎัม

1.บัญชียาสมุนไพร

No.	รายการยา	รูปแบบ	ประเภท
1	ขมิ้นชัน 500 mg	cap	ED
2	ยาอมมะแว้ง	tab	ED
3	ฟ้าทะลายโจร (สารสกัด 12mg) 500 mg	cap	ED
4	ครีมพญาออย 5 g	cream	ED
5	โพลครีม 30 g	ointment	ED
6	ครีมใบบัวบก 20 g	cream	ED
7	เจลพริก 30 g	gel	ED
8	ยาระบายมะขามแขก	tab	ED
9	ประสะไพล 500 mg	cap	ED
10	ยาหอมนวโกฐ 30 g	ยาผง	ED
11	จันทน์ลีลา 500 mg	cap	ED
12	สหัสธารา 500 mg	cap	ED
13	ชาชิง	ยาผง	ED
14	มะระขี้้นก 500 mg	cap	ED
15	เพชรสังฆาต 400 mg	cap	ED
16	ปราบชมพูทวีป 500 mg	cap	ED
17	ยาธาตุบดเชย ขวด 120 ml	ยาน้ำ	ED
18	เถาวัลย์เปรียง 400 mg	cap	ED
19	ยาตรีผลา 500 mg	cap	ED
20	ยาเบญจกูล 400 mg	cap	ED
21	ยาแก้ไอมะขามป้อม	ยาน้ำ	ED
22	ยาหอมเทพจิตร	tab	ED
23	ยาบำรุงโลหิต 500 mg	cap	ED
24	ชาขงหญ้าดอกขาว	ชาขง	ED
25	ชาขงรางจืด	ชาขง	ED
26	ลูกประคบ	-	-
27	เจลวานหางจระเข้ 15 g	gel	NED
28	ยาเขียวหอม 500 mg	cap	ED
29	ยาสมุนไพรเฝ้ายา 30 g	ซอง	ED
30	ยาสุขไสยาสน์ 500 mg	ซอง	ED จ2
31	ยาพอก	ซอง	ED
32	ยาทำลายพระสุเมรุ 500 mg	cap	ED จ2
33	ยาทำลายพระสุเมรุ 2 g	ซอง	ED จ2
34	ยาตำรักขาววัยทอง 30 g	ซอง	ED
35	ยาตำรักบำรุงน้ำนม 30 g	ซอง	ED
36	ยาตำรตรีผลา 30 g.	ซอง	NED

No.	รายการยา	รูปแบบ	ประเภท
37	ผง 15 g.	ซอง	ED
38	น้ำยาอดบุหรี 240 ml.	ขวด	ED
39	น้ำมันกัญชา 10 ml	ขวด	ED จ2
40	ดีปลี่ 15 g.	ซอง	NED
41	คำฝอย 15 g.	ซอง	ED
42	กานพลู 15 g	ซอง	ED

บัญชียานับสนุน

1.บัญชียา service plan 9 รายการกรณี refer back

No.	รายการยา	รูปแบบ	ประเภท
1	Alendronate 70 mg	tab	ง
2	Atorvastatin 40 mg	tab	ข
3	Carvedilol 25 mg	tab	ค
4	Carvedilol 6.25 mg	tab	ค
5	Hydroxyprogesterone 250 mg	inj	ข
6	Montelukast 10 mg	tab	ค
7	Nicardipine 10 mg inj.	inj	ค
8	Progesterone 100 mg	cap	ง
9	Vitamin D2 200,000 IU	cap	ก

บัญชียานับสนุน

2.บัญชียานับสนุนเฉพาะรายจากหน่วยงานนอก

No.	รายการยา	รูปแบบ	ประเภท
1	Chloroquine phosphate 250 mg	tab	ก
2	Primaquine phosphate 15 mg	tab	ก
3	Primaquine phosphate 7.5 mg	tab	ก
4	ARTESUNATE 60 mg inj.	sterile sol	ค